

Validation française de la Stigma Resistance Scale, échelle de résistance à la stigmatisation auprès de personnes souffrant de troubles psychotiques

GOMEZ S.^a, ATTAL J.^b, BESSON M.^c, BOGGERO M.^d, BOTTAI T.^e, GAUBERT B.^a, GIORDANA J.Y.^f, MASSON D.^g, MORA G.^h, MILLES-SIMONET C.ⁱ, SCHANDRIN A.^j, SIMONET B.^k, LECARDEUR L.^l

a Service de Psychiatrie, URC de Psychiatrie, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Université Nice Côte d'Azur

b Service de Psychiatrie, hôpital de la Colombière Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
c Pôle de Psychiatrie Générale, Centre Hospitalier de Martigues, Groupement Hospitalier et Universitaire des Hôpitaux des Bouches du Rhône

d Centre Hospitalier Sainte-Marie, Nice

e Centre Hospitalier de Martigues, Groupement Hospitalier et Universitaire des Hôpitaux des Bouches du Rhône

f Comité Départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes

g Centre Psychothérapique de Nancy

h Service de Pédopsychiatrie, Centre Hospitalier Sainte-Marie, Clermont-Ferrand

i Centre Hospitalier Universitaire de Nice

j La Villa Orygen, Centre d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale, Service de Psychiatrie adulte, Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, Université de Montpellier

k Service de Neurochirurgie, FHU INOVPAIN, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Université Côte d'Azur


l DueL, Nice

Objectifs

L'objectif de cette étude était de traduire la Stigma Resistance Scale en langue française et d'examiner ses qualités psychométriques afin de pouvoir mesurer la résistance à la stigmatisation chez des personnes souffrant de troubles psychotiques

Matériel et méthode

La Stigma Resistance Scale est un auto-questionnaire composé de 20 items regroupés en 5 sous-échelles : différenciation entre soi et les autres (3 items), identité personnelle (4 items), cognitions personnelles (3 items), résistance à la stigmatisation des pairs (5 items) et résistance à la stigmatisation du public (5 items). Chaque item est noté de 1 (pas d'accord) à 4 (d'accord). Plus le score est élevé, plus grande est la résistance.



Validation

L'étude de validation de la version francophone de cet auto-questionnaire est multicentrique et vise à tester les qualités psychométriques chez des patients souffrant de trouble psychotique.

Le protocole inclut un questionnaire socio-démographique ainsi que 7 auto-questionnaires.

Variables	Outils
Autostigmatisation et résistance	<ul style="list-style-type: none">Cible de la validation : Version francophone de la Stigma Resistance ScaleInternalized Stigma of Mental Illness (Ritsher - Boyd - et al. 2003)
Symptomatologie	<ul style="list-style-type: none">Autoévaluation des symptômes négatifs (SNS) (Dollfus et al. 2016)Inventory de dépression - BDI II (Beck et al. 1994)
Insight	Echelle d'insight de Birchwood- BIS (Birchwood et al. 1994, trad. Favrod et al. 2006)
Insight cognitif	Echelle d'insight cognitif de Beck - BCIS (Beck et al. 2004)
Qualité de vie	Questionnaire de qualité de vie - SQoL (Boyer et al. 2010)

L'étude, approuvée par un comité de protection des personnes, a été menée auprès de 59 patients souffrant de troubles psychotiques, recrutés dans 7 centres investigateurs et les données ont été collectées via des entretiens semi-structurés et des auto-questionnaires.


Résultats

Analyse factorielle : la structure en cinq facteurs de la version originale de la Stigma Resistance Scale obtenue avec une population multi-diagnostique n'est pas retrouvée par l'analyse factorielle confirmatoire dans notre échantillon. Une analyse factorielle exploratoire révèle deux facteurs latents.

Cohérence interne : forte → coefficient alpha de Cronbach : supérieur à 0.7

Validité convergente : bonne → corrélation obtenue avec le seul instrument de mesure contenant une sous-échelle de résistance à la stigmatisation (Internalized Stigma of Mental Illness) : $r = -.37$

Validité divergente : satisfaisante → scores à la Stigma Resistance Scale fortement corrélés avec les scores obtenus avec les autres échelles, mesurant la symptomatologie négative, la dépression, la qualité de vie et l'insight



Conclusion

L'étude, qui visait à valider la Stigma Resistance Scale en langue française, suggère une structure en deux facteurs chez les patients souffrant de troubles psychotiques. Les deux dimensions identifiées reflètent une attitude proactive face à la stigmatisation (égocentrisme) et une volonté de défendre les droits des personnes atteintes de troubles mentaux (allocentrisme). Des facteurs culturels peuvent expliquer les différences dans les modèles factoriels entre la version originale et la version française.

La Stigma Resistance Scale est le premier outil validé en langue française permettant une auto-évaluation spécifique de la résistance à la stigmatisation avec de bonnes propriétés psychométriques pour les patients souffrant de troubles psychotiques.